



## **TVT CUTÂNEO DISSEMINADO: RELATO DE CASO**

Danielly Dias Moreira<sup>1\*</sup>; Caio Flávio Miranda Dutra<sup>1</sup>; Adriano Sílvio Neto<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Medicina Veterinária, Faculdade do Futuro, Manhuaçu, Minas Gerais, Brasil.

O Tumor Venéreo Transmissível (TVT) é uma neoplasia de células redondas e acomete a mucosa genital de cães machos e fêmeas, podendo afetar outras regiões do corpo como a cavidade oral, ânus e tecido subcutâneo. O presente trabalho teve como objetivo relatar um caso de TVT com manifestação cutânea disseminada. Paciente fêmea, canina, SRD, 11 anos, 24 kg foi atendida na clínica veterinária municipal (Manhuaçu, MG) com queixa de anorexia, emagrecimento progressivo e aumento de volume disseminado pelo corpo. No exame físico foi constatado caquexia, desidratação, mucosas hipocoradas, febre e a presença de nódulos cutâneos disseminados em dorso e abdômen. A tutora relatou que o animal havia passado por tratamento de TVT há alguns meses e que o tratamento não havia sido concluído. Foi realizado teste rápido para erliquiose com resultado positivo, deu-se início ao tratamento com doxiciclina (10mg/kg). Foi feito exame citológico do nódulos por meio de punção aspirativa por agulha fina (PAAF), que demonstrou a presença de células tumorais redondas compatíveis com TVT. Após duas semanas, deu-se início do tratamento com sulfato de vincristina na dose de 0,025 mg/kg, instituídas oito sessões e após isto houve regressão dos nódulos e a paciente obteve alta médica. A ocorrência do TVT na forma cutânea é considerado um acontecimento incomum na clínica de pequenos animais. No presente relato a infrequência da tutora em seguir o protocolo terapêutico adequadamente (7 em 7 dias) no tumor primário pode ter contribuído para o posterior desenvolvimento das metástases. Assim, se faz imprescindível seguir rigorosamente o protocolo quimioterápico do TVT a fim de evitar recidivas do tumor ou ainda o surgimento de metástases. Concluiu-se que o sulfato de vincristina foi eficiente no tratamento da manifestação cutânea do TVT.

**Palavras chaves:** Tumor venéreo transmissível; Cão; Tratamento; Vincristina.

